

Aprikose

Sorte:

Goldrich

Obstart:

Aprikose, *Prunus armeniaca*



Herkunft:	
Züchter, Ort	Forschungszentrum Prosser, Washington State Universität, USA
Eltern, Abstammung	Sunglo x Perfection, 1954 selektiert
Typen, Selektionen	INFEL 2184
Synonyme	Sungiant, Jumbo Cot
Schutzrechte	freie Sorte
Blüte:	
Zeitpunkt, Blühstärke	frühe bis mittelfrühe Blütezeit, idealer Blütenansatz
Fertilität	selbststeril
Bestäubersorten	CARMINGO ® Pricia (S), TSUNAMI ® EA 5016 (S), PINKCOT ® Cotpy (S), PINK MARRY ®, Flopria (S), CARMINGO ® Mediabel (S), Orangenaprikose, Robada (S), Iziagat (S), Lotte (S), Harogem, ORANGE SUMMER ® Zaitorde (S)
Frostanfälligkeit	mittelstarke Anfälligkeit der Blütenknospen gegenüber Winterfrost
Frucht:	
Reifezeit	mittel, 6 bis 9 Tage nach 'Orangenaprikose'
Größe, Form	groß bis sehr groß, hochgebaut, länglich mit deutlicher Seitennaht
Farbe	intensiv gelb bis hellorange, sonnenseits leicht rötlich punktiert
Fruchtfleisch	orangefarben, sehr fest, wenig saftig
Geschmack	bei zu früher Ernte sehr sauer, erst nach einigen Tagen der Lagerung wird die Säure abgebaut
Platzempfindlichkeit	gering
Steinlöslichkeit	lösend
Lagerung	sehr gut
Baum:	
Wuchs	stark bis sehr stark, aufrecht, wenig verzweigend, ab Vollertragsphase ausladend
Ertrag	hoch bis sehr hoch, charakteristisch stärkerer Junifruchtfall, Ausdünnung erst nach dem Fruchtfall durchführen

Aprikose

Beurteilung:	Die robuste Sorte besticht durch Größe und Haltbarkeit. Die feste Frucht färbt früh um, ist aber erst vollreif ausreichend saftig und aromatisch. Wenn die ersten Früchte fallen, ist der optimale Erntetermin erreicht. Aufgrund der guten Transportfähigkeit sind die Früchte auch für den Großhandel geeignet. Negativ ist der säurebetonte Geschmack sowie die fehlende Deckfarbe.
---------------------	--