Süßkirsche

**Sorte:** **Early Korvik (S)**

Obstart: Süßkirsche, *Prunus avium*

| | |
|---|---|
| **Herkunft:** | |
| Züchter, Ort | Blazek, Holovousy, Tschechien |
| Lizenzinhaber | Artevos, Deutschland |
| Eltern, Abstammung | Mutation von Korvic (S) |
| Schutzrechte | EU-Sortenschutz |
| **Blüte:** | |
| Zeitpunkt | mittel, hohe Blühstärke |
| Fertilität | selbststeril |
| S-Allele, Sterilitätsgruppe | S2 S6, Gruppe 15 |
| Bestäubersorten | CERASINA ® Prim 2.1 (S), Burlat, Fertille (S), SATIN ® Sumele (S), STARBLUSH ® SPC 207 (S), Walter (S), Kordia, KIR LAMOUR ® KSG 24 A (S), CERASINA ® Final 13.1 (S), KIR ROSSO ® KSG 03 A (S) |
| Inkompatibel mit | Korvic (S) |
| **Frucht:** | |
| Reifezeit | mittel, 4.-5. Kirschwoche |
| Größe, Form | groß bis sehr groß, 29-31 mm, 12-15 g, herzförmig mit deutlich ausgeprägter Spitze, langer bis sehr langer Stiel, der je nach Witterung eine mehr oder weniger stark ausgeprägte Pigmentierung aufweist |
| Farbe | dunkel- bis schwarzrot mit leichtem Violett-Ton, hoch glänzend |
| Fruchtfleisch | dunkelrot bis schwarzrot, mittelfest bis fest, Festigkeitsindex 68-72, angenehme Struktur, saftig, feste Schale |
| Geschmack | würziges Aroma mit feiner Säure, bei zu früher Ernte leichter Bitterton |
| Platzempfindlichkeit | gering bis mittel, vorwiegend in der Stielgrube |
| **Baum:** | |
| Wuchs | mittelstark, in der Vollertragsphase ausladend, gut verzweigend, hängendes Fruchtholz, durch starke Blütenbildung am einjährigen Holz leicht verkahlend, gesundes und tief dunkelgrünes Laub |
| Ertrag | ideal bis hoch, gleichmäßiger als 'Kordia' |

gräb gbr gehölze und obstbau · bassenheimer straße 49 · d-56220 kettig
fon +49 (0)2637 – 94 01 73 · fax +49 (0)2637 – 94 01 74 · mail: info@graeb.com · www.graeb.com

## Süßkirsche

| | |
|---|---|
| **Beurteilung:** | Kurz vor 'Kordia' reifende Sorte mit attraktivem Äußeren und regelmäßig hohen Erträgen. Die Früchte reifen gleichmäßig, hängen locker und sind sehr gut pflückbar.<br><br>In Jahren mit sehr hohem Behang und in Verbindung mit sehr hohen Temperaturen baut die Fruchtfleischfestigkeit schnell ab. |